

## 主要な農薬におけるミツバチとハナアブの影響表

2026.02.06作成-001

商品名（50音順）	ミツバチへの影響日数	ハナアブへの影響日数	商品名（50音順）	ミツバチへの影響日数	ハナアブへの影響日数
アーデント水和剤	3日	同	ダブルシューターSE	2日	同
アクタラ粒剤5	30日	同	ダブルストッパー	巣箱周辺は避ける	同
アグリメック	14日	同	ダブルフェースフロアブル	1日	同
アグロスリン乳剤	20~30日	同	ダントツ粒剤	45日	同
アタブロン乳剤	1日	同	チェス顆粒水和剤	影響なし	同
アディオン乳剤	使用を避ける	同	ディアナSC	3~7日	同
アドマイヤー1粒剤	30~60日	同	トアローフロアブルCT	1日	同
アファーム乳剤	2~3日	同	トランスフォームフロアブル	10日	同
アミスター20フロアブル	影響なし	1日	トリフミンジェット	影響少ない	同
アルバリン粒剤	40日	同	トルネードエースDF	1日	同
ウララDF	影響なし	同	ニッソラン水和剤	影響なし	同
エコピタ液剤	1日	同	ネクスターフロアブル	翌日導入可能	同
オレート液剤	1日	同	バリアード顆粒水和剤	1~2日	同
カウンター乳剤	1日	同	ピラニカEW	1日	同
カスケード乳剤	1日	同	ファルコンフロアブル	1日	同
カルホス乳剤	21日	同	ファンタジスタ顆粒水和剤	散布翌日	同
カンタスドライフロアブル	少ない	同	ファンベル顆粒水和剤	散布翌日	同
グレーシア乳剤	1日	同	フーモン	1日	同
ゲッター水和剤	影響なし	同	フェニックス顆粒水和剤	1日	同
コテツフロアブル	10~21日以上	同	フォース粒剤	21日	同
コルト顆粒水和剤	放飼中は避ける	同	フルピカくん煙剤	影響なし	同
コロマイト水和剤	1日	使用禁止	フルピカフロアブル	影響なし	同
コロマイト乳剤	1日	使用禁止	プレオフロアブル	1日	同
サフォイル乳剤	1日	同	プレバソンフロアブル5	1日	同
サブリナフロアブル	影響なし	同	ベストガード水溶剤	6日	同
サンマイトイフロアブル	4日	同	ベストガード粒剤	45日以上	同
ジャストミート顆粒水和剤	少ない	同	ベリマークSC	1日	同
スコア顆粒水和剤	1日	同	ベルクートフロアブル	影響なし	同
スタークル粒剤	40日	同	ボトキラー水和剤	影響なし	1日
スターマイトフロアブル	1日	同	マイトコーネフロアブル	1日	同
ストロビーフロアブル	影響なし	同	マッチ乳剤	1日	同
スピノエース顆粒水和剤(5000倍)	3~7日	使用禁止	マブリックジェット	3日	同
セイビアーフロアブル20	影響なし	同	マブリック水和剤20	2~3日	同
ダニオーテフロアブル	影響なし	同	モスピランジェット	1日	同
ダニサラバフロアブル	1日	同	モスピラン顆粒水溶剤	1日	同
ダニトロンフロアブル	1日	同	レーバスフロアブル	1日	同
ダニメツフロアブル	1日	同	ロブラー水和剤	1日(影響少ない)	同
ダニ太郎	1日	同	ロムダンフロアブル	1日	同
タフパール	1~2日	同			

※商品名（農薬名）は、令和7年12月現在での登録のある薬剤を掲載している。

※農薬の再評価が進行中であり、影響日数等が今後変更になることがあります。

※時期・環境等により影響日数は異なります。農薬防除時の目安としてください。

(注) 本表ミツバチの影響日数に関しては、令和6年~7年に、農薬原体メーカー等への聞き取り等により得られた回答や

メーカー資料により確認した内容を参考に作成、またハナアブに関しては欧州での影響評価聞き取りを参考に作成しました。