

商品名 (50音順)	ミツバチへの影響日数	ハナアブへの影響日数	商品名 (50音順)	ミツバチへの影響日数	ハナアブへの影響日数
アーデント水和剤	3日	同	ダブルシューターSE	2日	同
アクタラ粒剤5	30日	同	ダブルストッパー	巣箱周辺は避ける	同
アグリメック	14日	同	ダブルフェースフロアブル	1日	同
アグロスリン乳剤	20～30日	同	ダントツ粒剤	45日	同
アタプロン乳剤	1日	同	チェス顆粒水和剤	影響なし	同
アディオン乳剤	使用を避ける	同	トアローフロアブルCT	1日	同
アドマイヤー1粒剤	30～60日	同	トランスフォームフロアブル	10日	同
アフーム乳剤	2～3日	同	トリフミンジェット	影響少ない	同
アミスター20フロアブル	影響なし	1日	トルネードエースDF	1日	同
アルバリン粒剤	40日	同	ニツラン水和剤	影響なし	同
ウララDF	影響なし	同	ネクスターフロアブル	翌日導入可能	同
エコピタ液剤	1日	同	バリアード顆粒水和剤	1～2日	同
オレート液剤	1日	同	ピラニカEW	1日	同
カウンター乳剤	1日	同	ファルコンフロアブル	1日	同
カスケード乳剤	1日	同	ファンタジスタ顆粒水和剤	散布翌日	同
カルホス乳剤	21日	同	ファンベル顆粒水和剤	散布翌日	同
カンタスドライフロアブル	少ない	同	フーモン	1日	同
ゲッター水和剤	影響なし	同	フェニックス顆粒水和剤	1日	同
コテツフロアブル	10～21日以上	同	フォース粒剤	21日	同
コルト顆粒水和剤	放飼中は避ける	同	フルピカくん煙剤	影響なし	同
コロマイト水和剤	1日	使用禁止	フルピカフロアブル	影響なし	同
コロマイト乳剤	1日	使用禁止	プレオフロアブル	1日	同
サフオイル乳剤	1日	同	プレバソフロアブル5	1日	同
サブリーナフロアブル	影響なし	同	ベストガード水溶剤	6日	同
サンマイトフロアブル	4日	同	ベストガード粒剤	45日以上	同
ジャストミート顆粒水和剤	少ない	同	ベリマークSC	1日	同
スコア顆粒水和剤	1日	同	ベルコートフロアブル	影響なし	同
スタークル粒剤	40日	同	ポトキラー水和剤	影響なし	1日
スターマイトフロアブル	1日	同	マイトコーネフロアブル	1日	同
ストロビーフロアブル	影響なし	同	マッチ乳剤	1日	同
スピノエース顆粒水和剤 (5000倍)	3～7日	使用禁止	マブリックジェット	3日	同
セイビアーフロアブル20	影響なし	同	マブリック水和剤20	2～3日	同
ダニオーテフロアブル	影響なし	同	モスピランジェット	1日	同
ダニサラバフロアブル	1日	同	モスピラン顆粒水溶剤	1日	同
ダニトロンフロアブル	1日	同	レーバスフロアブル	1日	同
ダニメツフロアブル	1日	同	ロブラール水和剤	1日 (影響少ない)	同
ダニ太郎	1日	同	ロムダンフロアブル	1日	同
タフパール	1～2日	同			

※商品名 (農薬名) は、令和 7 年 12 月 現在での登録のある薬剤を掲載している。

※農薬の再評価が進行中であり、影響日数等が今後変更になることがあります。

※時期・環境等により影響日数は異なります。農薬防除時の目安としてください。

(注) 本表ミツバチの影響日数に関しては、令和6年～7年に、農薬原体メーカー等への聞き取り等により得られた回答や

メーカー資料により確認した内容を参考に作成、またハナアブに関しては欧州での影響評価聞き取りを参考に作成しました。

追加項目

下記追加の農薬影響情報は、ハナアブ導入先で得られた事例や知見を参考に作成しております。

商品名 (50音順)	ミツバチへの影響日数	ハナアブへの影響日数	備考
ディアナSC	3～7日	使用禁止	変更
グレーシア乳剤	翌日	放飼中注意	変更
ファインセーブ	1日	乾くまで注意	散布後1週間では問題なし。
ベネビア	1日	放飼中注意	